



# Vaccination af personer med særlig risiko for pneumokoksygdom

Der findes fire vacciner mod pneumokoksygdom, som er godkendt i Danmark; PCV13 (Prevenar 13), PCV15 (Vaxneuvance), PCV20 (Apexxnar) og PPV23 (Pneumovax).

- PCV13 anbefales til personer under 18 år med særlig høj risiko. Der er mulighed for klausuleret tilskud.
- PCV15 er godkendt til personer fyldt 18 år. Der ydes ikke tilskud.
- PCV20 anbefales til personer fyldt 18 år med særlig høj risiko. Der er mulighed for klausuleret tilskud.
- PPV23 tilbydes gratis til alle nedenstående risikogrupper, dog ikke børn under 2 år.

Risikogrupper	PPV23	Konjugeret vaccine
Personer med forhøjet risiko: <ul style="list-style-type: none"><li>• Raske personer på 65 år og derover</li><li>• Beboere på plejehjem eller botilbud</li><li>• Kronisk hjerte-, lunge-, lever-, nyre-sygdom</li><li>• Diabetes mellitus</li><li>• Svejsere.</li></ul>	<b>Vaccination hvert 6. år</b> 1 dosis PPV23. Ingen antistofmåling.	Anbefales ikke.
Personer i særlig høj risiko: <ul style="list-style-type: none"><li>• Særlige risikogrupper under 18 år*</li><li>• Manglende milt eller dysfunktion af milten</li><li>• Immunsuppression</li><li>• Liquorlækage</li><li>• Tidligere invasiv pneumokok-sygdom</li><li>• Cochlear implantation</li><li>• Stamcelletransplantation</li><li>• Organtransplantation.</li></ul>	<b>Vaccination hvert 6. år</b> 1 dosis PPV23. Ingen antistofmåling.  <b>Revaccination inden 6 år</b> Hvis der er mistanke om nedsat immun-respons ved vaccination, så <u>kan</u> der laves en antistofmåling efter 3-5 år og herefter kan revaccination eventuelt fremskyndes.	Anbefales. Der gives klausuleret tilskud.  Personer under 18 år: 1 dosis PCV13  Personer over 18 år: 1 dosis PCV20**

Læs mere om vaccinationsprogrammet på [ssi.dk/pneumokok](https://ssi.dk/pneumokok)



## Når personen skal have begge vacciner

Er borgeren tidligere vaccineret med PPV23?

Ja

1 dosis konjugeret vaccine minimum ét år efter tidligere vaccination med PPV23.

Nej

1 dosis konjugeret vaccine hvorefter der skal gå minimum 8 uger før, der kan gives PPV23.

\* For uddybende information om særlige risikogrupper under 18 år - se [ssi.dk/pneumokok](https://ssi.dk/pneumokok)

\*\* Personer der tidligere har fået PCV13 eller PCV15 anbefales ikke PCV20